

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2294

Modifiche alla DGR n. 1392 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Intesa Stato-regioni 31 gennaio 2018 (Rep.20/CSR). Approvazione Progetto «Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale». Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 ai sensi del D. Lgs 118/2011".

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Funzionaria del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità, dalla Responsabile A.P. "Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria - determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno - nuovi modelli organizzativi" e confermata dalla Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con la DGR n. 1392/2018, la Giunta regionale, previo parere favorevole del Comitato di Valutazione - Istituito con Decreto Direttoriale del 6 aprile 2018, presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute - ha approvato il Progetto regionale concernente le "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale".

Il Progetto in parola, articolato in quattro obiettivi, si propone di offrire materiale informativo e di sensibilizzazione sull'importanza del disagio psichico e sull'opportunità di un intervento precoce, di intercettare precocemente la popolazione a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale, di porre in essere interventi diretti ad implementare i fattori protettivi del benessere psichico ed, infine, di postvalutare l'efficacia dei trattamenti. Il Progetto prevede, altresì, che le attività, che coinvolgono determinate U.O. di Ginecologia ed Ostetricia, oltre alle Unità Consultoriali, siano svolte sperimentalmente nell'ASL di FG, LE e BAT.

Su impulso del competente Servizio regionale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto dai Referenti progettuali delle predette ASL, finalizzato a pervenire all'elaborazione di una proposta operativa del Progetto, idonea ad essere applicata uniformemente in tutte le Aziende interessate. E' stata anche coinvolta nelle riunioni l'ASL BA, per l'eventuale collaborazione, prevista nella DGR 1392/2018, finalizzata al raccordo tra le Aziende.

Successivamente, con nota prot. U 646081-4 del 25/10/2018, l'ASL BAT ha chiesto l'esclusione dalla progettualità in questione, motivata dalla quiescenza del Direttore dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Barletta in cui il Progetto si sarebbe dovuto realizzare e dei conseguenti problemi organizzativi.

Nel corso degli incontri, il Gruppo di Lavoro predetto, in considerazione delle risorse economiche a disposizione, delle peculiarità di ciascun territorio e della presenza, in alcune Unità Operative di Ginecologia ed Ostetricia di Ambulatori per l'assistenza psicologica prenatale, ha rilevato la necessità di apportare modifiche sia pur non sostanziali, rispetto a quanto già valutato favorevolmente dal Ministero della Salute (nota prot. n. 0013495 dell'8/5/2018- DGPRES - MDS - P) ed approvato con la DGR 1392/2018, al fine di per realizzare azioni uniformi nei territori interessati.

In particolare il Gruppo di Lavoro ha convenuto sull'opportunità di:

- escludere i Consultori dall'attività di somministrazione dei test finalizzati all'individuazione del rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale;
- riservare esclusivamente ai Consultori del Distretto Socio Sanitario su cui insistono le U.O. di Ginecologia ed Ostetricia individuate dal Progetto, la segnalazione al Punto Nascita delle situazioni a rischio individuate fra le gravide seguite in consultorio;
- prevedere, a seconda dei casi, ai fini della presa in carico:
 - la segnalazione delle situazioni a rischio ai Consultori dei Distretti Socio Sanitari di provenienza delle pazienti;
 - l'invio all'Ambulatorio per l'assistenza psicologica prenatale, ove esistente;
 - l'invio ai Servizi di Salute Mentale, in caso di necessità.

- rivalutare le pazienti dopo il parto, prima delle dimissioni (entro massimo 7 giorni dal parto), attraverso la somministrazione esclusivamente dell'EPDS;

- prevedere che il monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia del trattamento-intervento messo in atto, sia effettuato a uno, sei, dodici mesi dal parto, tramite la somministrazione esclusivamente dell'EPDS;

- monitorare i falsi negativi prevedendo che, al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate, vengano contattate a campione;

- estendere a tutte le fasi progettuali la partecipazione dell'ASL BA già coinvolta a fini di coordinamento;

- infine, considerate le predette modifiche, apportare variazioni al cronoprogramma previsto nel Progetto "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale" allegato alla DGR 1392/2018, come segue:

- All'Obiettivo specifico 1:
 - unificare in un'unica azione la: "creazione materiale cartaceo" e la "realizzazione sito web" denominandola "creazione materiale cartaceo e realizzazione sito web" da attuarsi nel primo mese del Progetto;
 - lasciare immutata l'azione "erogazione materiale cartaceo" per tutta la durata del Progetto.
- All'Obiettivo specifico 2:
 - modificare la dicitura dell'azione "somministrazione test pre parto" in "somministrazione batteria test completa alle donne gravide in ambulatorio preospedalizzazione 30 +/-15 gg prima del parto" da attuarsi dal 4° al 7° mese del Progetto;
 - aggiungere l'azione "creazione profilo di rischio individuale" da attuarsi dal 4° al 7° mese del progetto;
 - modificare la dicitura dell'azione "pianificazione intervento nel caso di rischio" in "pianificazione intervento in caso di rischio medio grave" e prevederne l'attuazione dal 4° al 7° mese del Progetto, invece che dal 5° al 10° mese del Progetto;
 - aggiungere l'azione "rafforzamento competenze individuali durante i tre giorni di degenza (spazio di ascolto in reparto)" da attuarsi dal 4° all' 8° mese del Progetto;
 - aggiungere l'azione "somministrazione EPDS a tutte le donne dopo il parto prima delle dimissioni" da attuarsi dal 4° all'8° mese del Progetto.
- All'Obiettivo specifico 3:
 - modificare la dicitura dell'azione "presa in carico tramite i servizi attivi" in "presa in carico tramite i servizi specialistici attivi delle donne a rischio di sindrome depressiva perinatale, individuate nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese della durata del progetto) da attuarsi dal 5° al 17° mese del Progetto;
 - eliminare l'azione "monitoraggio a III, VI, XII mesi".
- All'Obiettivo specifico 4:
 - modificare la dicitura dell'azione "somministrazione EPDS" in "monitoraggio attraverso somministrazione EPDS alle donne a rischio medio-grave trattate, il 1°, 6° e 12° mese dall'inizio del trattamento" da attuarsi dal 6° al 17° mese del Progetto;
 - eliminare l'azione "colloquio clinico";
 - aggiungere l'azione "monitoraggio falsi negativi" da attuarsi dal 10° al 13° mese del Progetto.

L'intervenuta rinuncia dell'ASL BAT, inoltre, rende necessario apportare modifiche alla DGR n. 1392/2018 ed all'allegato inerente il Progetto "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale".

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di garantire l'attuazione sperimentale del Progetto in almeno tre ASL ed al contempo di realizzare un'applicazione uniforme del Progetto nei tutti i territori individuati, senza che ciò comporti variazioni di spesa, si propone alla Giunta Regionale:

- di modificare il Progetto "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale", approvato con la DGR 1392/2018, come di seguito indicato:

- **alla pag. 1**, in riferimento ai **coordinatori scientifici del Progetto**, individuare, oltre al già indicato Prof. Antonello Bellomo, il **Dott. Mario Vicino** - Direttore dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale "Di

Venere” di Bari - in luogo del Dott. Antonio Belpiede ed il **Dott. Luigi Giuseppe Palma** - responsabile del Servizio di Psicologia ospedaliera del P.O. “V. Fazzi” di Lecce - in luogo della Dott.ssa Angela Belsanti;

- **alla pag. 3**, in riferimento alle **Unità Operative coinvolte** e nello specifico relativamente **all’Unità Operativa 2 ed ai Referenti**, sostituire l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’ASL BAT ed i relativi Referenti, Dott. Antonio Belpiede e Dott.ssa Angela Belsanti, con **l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’ASL BA** ed individuare i Referenti nel **Dott. Mario Vicino** e nella **Dott.ssa Rosa Guagliardo**;
- **alla pag. 5**,
 - **terzo capoverso**, in riferimento alle ASL individuate, individuare l’ASL BA, in luogo dell’ASL BAT;
 - **quarto capoverso**, in riferimento alle Unità Operative Ospedaliere coinvolte, sostituire l’U.O. ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta con **l’U.O. ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere “ di Bari**;
- **alla pag. 6, terzo capoverso**, in riferimento alla somministrazione dei test, sostituire le parole “ed i Consulteri Familiari delle tre ASL citate (Foggia, BT e Lecce)” con **“ed a quelle segnalate dai Consulteri Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL citate (Foggia, Bari e Lecce)**;
- **alla pag. 7, terzo capoverso**, sostituire le parole “Dopo un mese dal parto, le pazienti sono nuovamente sottoposte ad altri 2 test” con **“Entro sette giorni dal parto, prima delle dimissioni, le pazienti sono nuovamente sottoposte all’EPDS”**
- **alla pag. 9 quarto capoverso**, in riferimento alle strutture previste per la presa in carico delle persone risultate ad alto rischio, sostituire le parole “(Consulteri familiari e psicologi presenti nei reparti di Ginecologia, nonché i Dipartimenti di Salute mentale nel caso di patologie conclamate)” con “(Consulteri familiari, psicologi presenti nei reparti di Ginecologia, **Ambulatori per l’assistenza psicologica perinatale, ove esistenti**, nonché i Dipartimenti di Salute mentale nel caso di patologie conclamate)”
- **alla pag. 10** sopprimere integralmente il secondo capoverso come di seguito trascritto “In merito all’obiettivo specifico n. 4 il Progetto prevede che, dopo 10-15 giorni dal parto, le pazienti siano nuovamente sottoposte ad altri 4 test ovvero: 1) il TI Labour Delivery Questionnaire (dove si richiedono informazioni su come è avvenuto il parto, se ci sono state problematiche o vari eventi stressanti) e nuovamente 2) Edinburgh Post-natal Depression Scale, 3) il CD-risk , per esplorare la resilienza delle donne, e 4) il Cope che valuta le strategie messe in atto per far fronte a eventuali difficoltà emerse nel peri-partum” e sostituirlo con **“Al fine di monitorare i falsi negativi, al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate, verranno contattate telefonicamente dallo psicologo a campione”**.
- **alla pag. 10, ultimo capoverso**, indicare l’ASL BA, in luogo dell’ASL BAT;
- **alla pag. 11**,
 - in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 1, indicare **l’ASL BA**, in luogo dell’ASL BAT;
 - in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 2, sostituire le parole “o i Consulteri Familiari delle tre ASL FG, BT e LE con **“o segnalate dai Consulteri Familiari dei distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL FG, BA, e LE”**
 - in riferimento allo standard di risultato dell’obiettivo specifico 2, sostituire le parole “ed ai Consulteri Familiari delle tre ASL FG, BT e LE con **“o segnalate dai Consulteri Familiari dei distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL FG, BA, e LE”**
 - in riferimento alle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2, sostituire le parole “Monitoraggio a III, VI, IX,XII mesi con EPDS” con **“somministrazione EPDS entro 7 giorni dal parto”**;
 - in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 3, indicare **l’ASL BA**, in luogo dell’ASL BAT;

- alla pag. 12,
 - in riferimento all'indicatore di risultato dell'obiettivo specifico 4, indicare l'ASL BA, in luogo dell'ASL BAT;
 - in riferimento alle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico , sostituire le parole "somministrazione batteria di test nel post parto" con "**monitoraggio falsi negativi**"
- alla pag. 13, sostituire il **CRONOPROGRAMMA** con quello di seguito riportato

	mese	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°		
Obiettivo specifico 1	creazione materiale cartaceo e realizzazione sito web	x																			
	Erogazione materiale cartaceo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Obiettivo specifico 2	Somministrazione batteria test completa alle donne gravide in ambulatorio preospedalizzazione 30+-15 gg prima del parto				x	x	x	x													
	Creazione profilo di rischio individuale				x	x	x	x													
	Pianificazione intervento nel caso di rischio medio grave				x	x	x	x													
	Rafforzamento competenze individuali durante i tre giorni di degenza (Spazio di ascolto in reparto)				x	x	x	x	x												
	Somministrazione EPDS a tutte le donne dopo il parto prima delle dimissioni (entro max 7 gg. dal parto)				x	x	x	x	x												
Obiettivo specifico 3	Presenza in carico tramite i servizi specialistici attivi delle donne a rischio di sindrome depressiva perinatale, individuate nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese della durata del progetto)					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Obiettivo specifico 4	Monitoraggio attraverso somministrazione EPDS alle donne a rischio medio-grave trattate, il 1°, 6° e 12° mese dall'inizio del trattamento						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Monitoraggio falsi negativi: al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di riferimento (4°-7° mese del progetto) escluse le donne trattate, verranno contattate telefonicamente dallo psicologo, a campione.										x	x	x	x							

- **alla pag. 15**, in riferimento all'Unità operativa, indicare l'**ASL BA**, in luogo dell'ASL BAT;

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997 :

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Funzionaria, dalla Responsabile A.P., dalla Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Di riapprovare il Progetto "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale", di cui alla DGR 1392/2018, con le modifiche esposte in narrativa, che si allega a fare parte integrante del presente provvedimento.
- Di dar mandato al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità di provvedere all'adozione degli ulteriori conseguenziali adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burp.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATO 1

Il presente allegato è composto di n. 17 pagine inclusa la presente



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

PROGETTO ESECUTIVO

Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale.

DURATA DEL PROGETTO:

Il progetto avrà la durata di 18 mesi di cui 12 di intervento.

COSTO:

€ 220.605,00=

COORDINATORI SCIENTIFICI DEL PROGETTO:

nominativo: Prof. Antonello Bellomo

struttura di appartenenza: Direttore U.O. SPDC a direzione universitaria allocato presso gli OO.RR. di Foggia

n.tel 0881 884274 – 0881 732285 email: antonellobellomo@tiscali.it

nominativo: Dott. Mario Vicino

struttura di appartenenza: Direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale "Di Venere" di Bari

n.tel 080 5015025 email: mario.vicino@asl.bari.it

nominativo: Dott. Luigi Giuseppe Palma

struttura di appartenenza: Responsabile Servizio di Psicologia Ospedaliera P.O. "V.Fazzi" di Lecce

n.tel: 0832 661083 email: giuseppeluigi.palma@gmail.com





REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

Obiettivo Specifico 1) Offrire attivamente alla donna e ai familiari, nell'ambito del percorso nascita, materiale informativo e sensibilizzazione sull'importanza del disagio psichico e sull'opportunità di un intervento precoce.

Sebbene nell'immaginario collettivo la gravidanza e la maternità siano associate ad un periodo felice e solo ad emozioni positive, in realtà numerose sono le complicanze psichiche che possono sopraggiungere nel periodo perinatale, che si estende dalla gravidanza fino al 1° anno postpartum, tanto che oggi si preferisce parlare di depressione nel peripartum piuttosto che nel post partum¹. Numerosi studi dimostrano come tale condizione materna si rifletta in scarse attenzioni alla gravidanza e alla salute del feto (nascita pretermine, basso peso alla nascita, complicanze mediche)², oltreché in effetti sull'attaccamento madre-bambino, possibili ritardi cognitivi del bambino, alterazioni della regolazione emotiva, ritardo nell'apprendimento scolastico e rischio di depressione in adolescenza³; pertanto è estremamente importante intervenire quanto più precocemente per tutelare la salute di madre e bambino. Sono stati individuati diversi fattori di rischio e fattori protettivi individuabili sin dalle prime fasi di gravidanza (tra gli altri fattori ostetrici, storia familiare o personale di patologia psichiatrica, disturbi dell'umore nel periodo mestruale, le complicanze mediche, il supporto del partner e dei familiari, fattori di vita stressanti, una gravidanza non desiderata o arrivata con difficoltà, o fattori psicologici come la resilienza allo stress)^{4, 5}. La rilevazione di tali importanti problematiche è resa però difficile in ragione del fatto che la madre spesso fatica a chiedere aiuto, non riconoscendo il disturbo come una patologia ma vivendolo con dei sensi di colpa e inadeguatezza, vissuti che portano la donna a mascherare il disagio e a chiedere aiuto molto tardi. Si stima che circa 3 donne su 4 non ricevano le cure adeguate per un mancato riconoscimento della patologia. Difatti le donne con depressione nel peripartum soffrono in silenzio per due motivi: la depressione e il senso di fallita maternità. Uno studio ha mostrato come su un forum in internet, che favorisce l'anonimato e la sicurezza di non essere giudicate, le madri affette da depressione parlino di senso di vergogna e disagio

¹ Hoertel N1, López S, H, Wall MM, González-Pinto A, Limosin F, Blanco C. Are symptom features of depression during pregnancy, the postpartum period and outside the peripartum period distinct? Results from a nationally representative sample using item response theory (IRT). *Depress Anxiety*. 2015 Feb;32(2):129-40. doi: 10.1002/da.22334. Epub 2014 Nov 25

² LINDGREN K (2001), Relationships among maternal-fetal attachment, prenatal depression and health practices in pregnancy. *Research in Nursing and Health*, 24, 203-217

³ STONE S., D., MENKEN A.E. *Perinatal and postpartum mood disorders*, Springer Publishing Company, New York, 2008

⁴ Sylvén SM1, Thomopoulos TP2, Kollia N3, Jonsson M4, Skalkidou A. Correlates of postpartum depression in first time mothers without previous psychiatric contact. *Eur Psychiatry*. 2017 Feb;40:4-12. doi: 10.1016/j.eurpsy.2016.07.003. Epub 2016 Nov 10

⁵ Hain S1,2, Oddo-Sommerfeld S2, Bahlmann F3, Louwen F2, Schermelleh-Engel K1 J., Risk and protective factors for antepartum and postpartum depression: a prospective study. *J Psychosom Obstet Gynaecol* 2016 Dec;37(4):119-129. doi: 10.1080/0167482X.2016.1197904. Epub 2016 Jul 4





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

psicosociale e parlino di se stesse con severa autocritica⁶. Il maggior ostacolo nel richiedere aiuto prima di giungere al "punto di crisi" pare pertanto essere rappresentato dallo stigma legato all'incapacità di far fronte alla maternità e di essere una "cattiva madre". Inoltre, le donne non sono in grado di differenziare tra i livelli "normali" di sofferenza post-partum e i sintomi depressivi che potrebbero richiedere un intervento⁷. Tali evidenze scientifiche suggeriscono l'importanza di partire, per la prevenzione, proprio dalla sensibilizzazione della donna e della famiglia al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza del proprio disagio e ad un conseguente precoce riconoscimento dei sintomi depressivi prima che questi raggiungono una soglia di "crisi".

La Unità Operativa SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) a direzione Universitaria, allocato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, ha attualmente all'attivo, in collaborazione con il reparto di ostetricia e ginecologia dell' OORR di FOGGIA, più di due anni di osservazione epidemiologica, contestualmente alla quale viene fornita informazione sulla depressione peripartum.

Il presente progetto prevede l'ampliamento dell'attività di osservazione epidemiologica, estendendola alle Unità consultoriale dell'ASL FG e coinvolgendo altre due ASL del territorio regionale, che vengono individuate nelle ASL BA e LE.

Verranno coinvolti i Consultori familiari delle AASSLL sopra indicate e le seguenti Unità Operative Ospedaliere:

- Ginecologia, Ospedali Riuniti di Foggia
- Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Di Venere Bari
- Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Vito Fazzi Lecce

Fattibilità: materiale sostenibile e di facile reperibilità

Criticità: traduzioni in lingua straniera

Rispetto alla ricerca effettuata nella ASL FG, si propone di effettuare un'adeguata campagna informativa sulle condizioni di disagio o di vero e proprio disturbo, correlati alla gravidanza ed al parto, mediante l'erogazione di materiale cartaceo, brochure e la creazione un sito web dedicato e coinvolgendo le figure

⁶Kantrowitz-Gordon, Internet confessions of postpartum depression, Issues Ment Health Nurs. 2013 Dec;34(12):874-82. doi: 10.3109/01612840.2013.806618

⁷McCarthy M1, McMahon, Health Care Women Int.2008 Jul;29(6):618-37. doi: 10.1080/07399330802089172. Acceptance and experience of treatment for postnatal depression in a community mental health setting.





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

professionali presenti presso i Consultori Familiari, nonché personale formato ad hoc, presso i reparti di Ginecologia presenti nelle tre ASL citate.

Obiettivo Specifico 2) Individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale attraverso la somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati, anche prevedendo nei Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari territoriali l'offerta attiva, sia alla donna che alla coppia, di colloqui psicologici che favoriscano il superamento del disagio e l'attivazione ed il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare la nuova situazione

Il Progetto prevede di somministrare a tutte le donne afferenti presso i Reparti di Ginecologia ed a quelle segnalate dai Consultori Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL citate (Foggia, Bari e Lecce), 30 giorni prima del parto, una batteria di test che esplorino in maniera globale la personalità, l'esposizione a fattori di rischio e la presenza di una sintomatologia ansiosa o depressiva. Il personale ASL che interverrà in questa fase preventiva (personale del Consultorio e psicologi dei reparti di Ginecologia che saranno specificatamente assunti ai fini della realizzazione delle attività progettuali) dovrà essere adeguatamente formato con specifico training sull'uso di questi strumenti di screening.

Alle donne che risultano a rischio di disagio psichico vengono offerti da parte da parte dell'U.O. che effettua lo screening interventi differenziati a seconda del livello di rischio, che possono essere garantiti dalle U.O. territoriali o ospedaliere della rete di assistenza.

I test in questione sono:

- una scheda dati di rilevazione circa le condizioni cliniche presenti e pregresse della donna e dove si ricercano eventuali fattori di rischio (anamnesi psichiatrica/organica positiva, eventi stressanti, supporto sociale⁸);
- l'Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) è l'unico test di screening attualmente riconosciuto a livello internazionale. Elaborato nel 1987 da Cox e Holden⁹. La sua applicazione può rivolgersi a popolazioni di origini etniche diverse. E' un questionario autosomministrabile composto da 10 item in grado di evidenziare nella settimana precedente alla somministrazione la presenza di sintomi depressivi, ansiosi o di

⁸ M.N. Norhayati, N.H. Nik Hazlina A.R. Asrenee, W.M.A. Wan Emilin, (2015) Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: A literature review, *Journal of Affective Disorders*, 175:34-52

⁹ Br J Psychiatry. 1987 Jun;150:782-6. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Cox JL¹, Holden JM, Sagovsky R.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

COORDINATORI AMMINISTRATIVI DEL PROGETTO:

nominativo: A.P. Dott.ssa Antonella Caroli

struttura di appartenenza: Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – Sezione Strategia e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'assistenza ospedaliera

n.tel: 080.5403492 email: a.caroli@regione.puglia.it

nominativo: Dott.ssa Isabella Di Pinto

struttura di appartenenza: Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – Sezione Strategia e Governo dell'Offerta – Servizio Governo dell'assistenza alle persone in condizione di fragilità.

n.tel 080.5403596 email: i.dipinto@regione.puglia.it

OBIETTIVI DEL PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Misure afferenti all'informazione, prevenzione, diagnosi e cura sulla sindrome

Il progetto è suddiviso in **4 obiettivi specifici:**

- Offrire attivamente alla donna e ai familiari, nell'ambito del percorso nascita, materiale informativo e sensibilizzazione sull'importanza del disagio psichico sull'opportunità di un intervento precoce.
- Individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale attraverso la somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati, anche prevedendo nei Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari territoriali l'offerta attiva, sia alla donna che alla coppia, di colloqui psicologici che favoriscano il superamento del disagio e l'attivazione ed il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare la nuova situazione.
- Implementare i fattori protettivi del benessere psichico mediante azioni di sostegno alle donne a rischio al fine di ridurre l'incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale, anche favorendo positive competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino un ambiente adeguato a sostenere lo sviluppo psichico.
- Postvalutazione mediante la somministrazione dei medesimi strumenti di screening e di valutazione utilizzati nella fase iniziale al fine di valutare l'efficacia del trattamento-intervento messo in atto.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

REFERENTE PROGETTO: PROF. ANTONELLO BELLOMO		
UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
UNITA' OPERATIVA 1	REFERENTE	COMPITI
ASL FG	- Prof. Antonello Bellomo (Direttore SPDC a direzione universitaria degli OO.RR. di FG) - Prof. Luigi Nappi (Direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia degli OO.RR. FG) -Dott.ssa Marianna di Portogallo (Referente rete consultoriale FG)	Attività di informazione, sensibilizzazione e screening Attività di presa in carico Attività di valutazione e post valutazione Attività formativa sulla somministrazione degli strumenti di valutazione standardizzati Attività statistica
UNITA' OPERATIVA 2	REFERENTE	COMPITI
ASL BA	-Dott. Mario Vicino (Direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia BA) -Dott.ssa Rosa Guagliardo (Referente rete consultoriale BA)	Attività di informazione, sensibilizzazione e screening Attività di presa in carico Attività di valutazione e post valutazione
UNITA' OPERATIVA 3	REFERENTE	COMPITI
ASL LE	- Dott. Antonio Perrone (Direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia LE) Dott.ssa Anna Grande (Referente rete consultoriale LE)	Attività di informazione, sensibilizzazione e screening Attività di presa in carico Attività di valutazione e post valutazione





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

ideazione suicidiaria¹⁰. Validato sia per la gravidanza che per il postpartum (Versione italiana della EPDS di Cox e Holden a cura di P. Grusso et al.) andando quindi a rappresentare il momento centrale del monitoraggio;

- Il Big-5 questionnaire (curatore edizione italiana L.Morante): Il BFQ individua cinque dimensioni fondamentali per la descrizione e la valutazione della personalità di ogni individuo (Energia, Amicalità, Coscienziosità, Stabilità Emotiva, Apertura Mentale);
- L'Experience in Close Relationship di Brennan in grado di evidenziare il peculiare stile di attaccamento nelle relazioni intime. Alcuni tipi di attaccamento (es. evitante o preoccupato) determinano un maggior rischio di depressione e ovviamente possono intaccare il normale sviluppo del bambino¹¹
- Il CD-Risk di Connor&Davidson¹² esplora la capacità dell'individuo di superare un periodo di difficoltà. La nascita di un figlio, con le inevitabili difficoltà e problematiche ad esso associate, può rappresentare per alcune donne il motivo scatenante un episodio depressivo¹³
- Il *brief-Cope* di Carver: valuta come l'individuo affronta le difficoltà: sappiamo dalla letteratura che alcune strategie di coping sono maggiormente associate alla depressione perinatale¹⁴

L'obiettivo di questa fase è fare in modo che le attività di screening e prevenzione sul benessere psichico della donna si strutturino propriamente come le attività di monitoraggio fisico e strumentale sul versante organico.

Entro sette giorni dal parto, prima delle dimissioni, le pazienti sono nuovamente sottoposte ad EPDS, le cui risultanze sono utili a ridefinire le modalità della presa in carico.

Fattibilità: elevata affluenza delle donne durante il periodo ostetrico presso le strutture coinvolte nel progetto.

Criticità: Va effettuata la formazione sull'uso degli strumenti di screening.

¹⁰ Perspectives in Psychiatric Care ISSN 0031-5990; The Psychometric Validation of the EPDS-K Among Korean Women: Does It Only Measure Depressive Symptoms? Young-sun Rhee, PhD, Jeong-hwan Park, PhD, RN, Hee-Jung Cha, PhD, and Kye-ha Kim, PhD, RN
¹¹ Brummelte S, Galea LA. Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal care. *Hum Behav*. 2016 Jan;77:153-66. doi: 10.1016/j.yhbeh.2015.08.008. Epub 2015 Aug 28

¹² Kathryn M. Connor, M.D., Jonathan R.T. Davidson, M.D. DEVELOPMENT OF A NEW RESILIENCE SCALE: THE CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE SCALE (CD-RISC), DEPRESSION AND ANXIETY 18:76-82 (2003)

¹³ Cheryl Ann Anderson, The Trauma of Birth, Health Care for Women International, DOI: 10.1080/07399332.2017.1363208

¹⁴ C. de Tychey et al. / Journal of Affective Disorders 85 (2005) 323-326





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

Obiettivo Specifico 3) Implementare i fattori protettivi del benessere psichico mediante azioni di sostegno alle donne a rischio al fine di ridurre l'incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale, anche favorendo positive competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino un ambiente adeguato a sostenere lo sviluppo psichico.

La depressione perinatale è un'epidemia globale che colpisce il 10-20% delle madri, con conseguenze negative che si ripercuotono sulla salute della donna, del partner e della prole nel breve e nel lungo termine¹⁵. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali¹⁶ classifica la depressione del periparto come un disturbo depressivo maggiore identificato durante la gravidanza o entro quattro settimane dopo il parto, sebbene alcuni esperti lo estendano ad un anno dopo il parto¹⁷. I sintomi osservabili sono quelli propri di un episodio depressivo maggiore con diminuzione dell'energia, scarsa concentrazione, disturbi del sonno, che però, in questo caso particolare, determinano una compromissione del legame materno-infantile e delle dinamiche familiari sane¹⁸. Difatti la depressione, pur essendo sempre un disturbo invalidante, è particolarmente problematica per la nuova madre che è incapace di prendersi cura del neonato oltre che di gestire le quotidiane responsabilità, che includono il prendersi cura dei bambini più grandi o il lavoro. Inoltre, è disponibile un'ampia letteratura che documenta sostanzialmente gli effetti negativi della depressione materna sui bambini, a partire dalla nascita¹⁹. In tal senso gli effetti maggiori della depressione perinatale sembrano interessare prevalentemente lo sviluppo cognitivo della prima infanzia, compreso il linguaggio e l'intelligenza, e il comportamento dei bambini fino a cinque anni dopo il parto²⁰. I dati presenti in letteratura relativi all'efficacia e alla tollerabilità dei trattamenti farmacologici e non-farmacologici della depressione perinatale sono tuttora insufficienti e ricchi di controversie. Tutti gli studi evidenziano che non trattare la depressione perinatale comporti conseguenze negative per la madre e per il bambino, soprattutto alla luce della durata media di un episodio depressivo perinatale, tra i tre e i nove mesi. Offrire

¹⁵Herba CM, Glover V, Ramchandani PG, Rondon MB. Maternal depression and mental health in early childhood: an examination of underlying mechanisms in low-income and middle-income countries. *Lancet Psychiatry*. 2016 Oct;3(10):983-992. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30148-1. Epub 2016 Sep 17

¹⁶American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013

¹⁷Gaynes BN, Gavin N, Meltzer-Brody S, et al. Perinatal depression: prevalence, screening accuracy, and screening outcomes. Evidence report/technology assessment no. 119. Rockville, Md.: Agency for Healthcare Research and Quality; 2005

¹⁸Swain AM, O'Hara MW, Starr KR, Gorman LL. A prospective study of sleep, mood, and cognitive function in postpartum and nonpostpartum women. *Obstet Gynecol*. 1997;90(3):381-386

¹⁹Goodman SH, Rouse MH, Connell AM, Broth MR, Hall CM, Heyward D. 2011. Maternal depression and child psychopathology: a meta-analytic review. *Clin Child Fam Psychol Rev*. 14:1-27

²⁰Murray L. The impact of postnatal depression on infant development. *J Child Psychol Psychiatry*. 1992;33(3):543-61





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

un servizio che si occupi di prevenzione e percorsi di cura per la depressione perinatale risulta cruciale per la qualità della vita e la salute non solo della donna, ma anche dell'intero nucleo familiare²¹.

Il supporto che verrà offerto sarà diretto ad implementare i fattori protettivi del benessere psichico mediante azioni di sostegno alle donne a rischio al fine di ridurre l'incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale, anche favorendo positive competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino un ambiente adeguato a sostenere lo sviluppo psichico. Le donne a rischio saranno invitate ad effettuare una consulenza-colloquio finalizzata all'acquisizione della consapevolezza delle stesse ad uscire dallo stato di solitudine che caratterizza la depressione perinatale. Il coinvolgimento è rivolto anche al padre, in quanto lo stesso può risentire del disagio psicologico della donna.

Le U.O. in campo sono prioritariamente le U.O. Ospedaliere di Ginecologia e Ostetricia e i Consultori Familiari. Gli operatori consultoriali (ostetriche, assistenti sociali, infermieri e psicologi) ed il personale delle unità operative ospedaliere (ginecologi, ostetrici, infermieri, pediatri, puericultrici), in relazione alle specifiche professionalità, realizzeranno colloqui psicologici individuali e di coppia, consulenze allattamento e cure neonatali, infant massage, anche, sul territorio, attraverso visite domiciliari.

Infatti, programmi di educazione prenatale e postpartum intensiva hanno mostrato benefici, in particolare nelle madri più giovani e nelle adolescenti primipare, con significativi miglioramenti nei punteggi alla Edinburgh Postnatal Depression Scale²².

Le persone risultate ad alto rischio ai test erogati in epoca prenatale o durante il monitoraggio in reparto, verranno ricontattate e prese in carico presso le strutture previste (Consultori familiari e psicologi presenti nei reparti di Ginecologia, Ambulatori per l'assistenza psicologica perinatale, ove esistenti, nonché i Dipartimenti di Salute Mentale nel caso di patologie conclamate).

Fattibilità: esistenza di offerta attiva di servizi per il percorso nascita assicurata dai consultori familiari e dai reparti di Ginecologia; precedente formazione di operatori per la promozione dell'allattamento al seno nelle 6 ASL pugliesi dal cui elenco si potrebbero ricavare i nomi delle ostetriche interessate alla promozione di tale pratica.

Criticità: parziale risposta delle donne all'offerta attiva di servizi.

²¹Winders Davis D, Myers J, Logsdon MC, Bauer NS, The Relationship Among Caregiver Depressive Symptoms, Parenting Behavior, and Family-Centered Care, *J Pediatr Health Care*. 2016 Mar-Apr;30(2):121-32. doi: 10.1016/j.pedhc.2015.06.004. Epub 2015 Jul 17

²²Howell EA, Balbierz A, Wang J, Parides M, Zlotnick C, Leventhal H. Reducing postpartum depressive symptoms among black and Latina mothers: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol*. 2012;119(5):942-949.





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

Obiettivo 4) Postvalutazione mediante la somministrazione dei medesimi strumenti di screening e di valutazione utilizzati nella fase iniziale al fine di valutare l'efficacia del trattamento-intervento messo in atto. Elaborazione statistica dei dati raccolti in fase pre e postvalutativa al fine di amplificare la conoscenza sulle cause della sindrome depressiva perinatale e sulle possibili più efficaci modalità di trattamento

Al fine di monitorare i falsi negativi, al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate, verranno contattate telefonicamente dallo psicologo a campione.

Per le donne risultate positive alla prima valutazione (pre-partuum) sarà assicurata una rivalutazione in modo prospettico durante tutto il periodo del postparto (uno, sei, dodici mesi dal parto), per identificare l'eventuale miglioramento sintomatologico a seguito dell'intervento terapeutico. A tal fine è previsto l'impiego della già citata Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).

Fattibilità: l'offerta del sostegno alle donne ed il rafforzamento dell'integrazione tra i Servizi della rete favorirà l'adesione alla post valutazione.

Criticità: rischio di drop out.

Il Progetto, nel suo complesso, è da considerare ampliativo dell'esperienza realizzata nell'ambito dell'ASL di FG e sperimentale nell'ambito dell'ASL di BA e LE.





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO 1	
<i>Risultato atteso/i</i>	Il risultato che si intende raggiungere consiste nel promuovere nelle donne la volontà di affrontare il tema della depressione perinatale e conoscerne le implicazioni a livello personale e relazionale, di coppia e familiare. Stimolare l'opinione pubblica a confrontarsi ed essere più consapevole della grande vulnerabilità psichica di ogni futura mamma.
<i>Indicatore di risultato</i>	Diffusione delle informazioni e sensibilizzazione in gran parte del territorio della AASSLL di Foggia, Ba e Lecce
<i>Standard di risultato</i>	Diffusione delle informazioni e sensibilizzazione in almeno il 70% del territorio delle AASSLL
OBIETTIVO SPECIFICO 2	
<i>Indicatore di risultato</i>	Nell'ambito del Percorso Nascita effettuare lo screening delle donne afferenti le U.O. di Ostetricia e Ginecologia o segnalate dai Consultori Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i Reparti di Ginecologia delle tre ASL FG, BA, LE
<i>Standard di risultato</i>	Screening su almeno il 50% delle donne che afferiscono alle U.O. di Ostetricia e Ginecologia ed ai Consultori Familiari delle ASL FG, BT e LE..
<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Somministrazione batteria di test pre parto; - Creazione profilo di rischio individuale; - Pianificazione intervento nel caso di rischio medio e grave; - Intervento di rafforzamento competenze individuali durante i tre giorni di degenza ospedaliera (spazio di ascolto in reparto); - Somministrazione EPDS entro 7 giorni dal parto
OBIETTIVO SPECIFICO 3	
<i>Indicatore di risultato</i>	Donne a rischio di sindrome depressiva perinatale prese in carico e che accettano il trattamento nelle ASL Foggia, BA e LE
<i>Standard di risultato</i>	Presenza in carico di almeno il 50% delle donne a cui è offerto il trattamento





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto psicologico individuale e di coppia - Supporto ginecologico - Sostegno alla funzione genitoriale - Consulenze allattamento e cure neonatali in particolare dove il rischio di disagio psichico si accompagna a quello sociale - Infant massage - Invio delle donne a rischio elevato ai Servizi specialistici per la salute mentale
OBIETTIVO SPECIFICO 4	
<i>Indicatore di risultato</i>	Postvalutazione donne trattate ASL Foggia, BA e Lecce
<i>Standard di risultato</i>	Nel 60% miglioramento clinico/riduzione punteggio EPDS
<i>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo specifico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio falsi negativi - Monitoraggio in itinere e valutazione post intervento.





DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

CRONOPROGRAMMA

	mese	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*
Obiettivo specifico 1	creazione materiale cartaceo e realizzazione sito web	x																	
	Erogazione materiale cartaceo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Obiettivo specifico 2	Somministrazione batteria test completa alle donne gravide in ambulatorio preospedalizzazione 30+15 gg prima del parto				x	x	x	x											
	Creazione profilo di rischio individuale				x	x	x	x											
	Pianificazione intervento nel caso di rischio medio grave				x	x	x	x											
	Rafforzamento competenze individuali durante i tre giorni di degenza (Spazio di ascolto in reparto)				x	x	x	x	x										
	Somministrazione EPDS a tutte le donne dopo il parto prima delle dimissioni (entro max 7 gg. dal parto)				x	x	x	x	x										
Obiettivo specifico 3	Preso in carico tramite i servizi specialistici attivi delle donne a rischio di sindrome depressiva perinatale, individuate nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese della durata del progetto)					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Obiettivo specifico 4	Monitoraggio attraverso somministrazione EPDS alle donne a rischio medio-grave trattate, il 1°, 6° e 12° mese dall'inizio del trattamento						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Monitoraggio falsi negativi: al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di riferimento (4°-7° mese del progetto) escluse le donne trattate, verranno contattate telefonicamente dallo psicologo, a campione.										x	x	x	x					





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

UNITA' OPERATIVA ASL FG		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale	n.1 psicologo a 18 ore	
	n.1 statistico a 18 ore	
		65.000,00
Beni e servizi	acquisto software statistico (Spss 22,0,0,0)	
	sviluppo piattaforma web	
	computer e cellulare	
	materiale cartaceo	
		25.605,00
Missioni	spostamenti verso altre sedi per attività formative, di informazione e collegamento	
		10.000,00
Incontri/Eventi formativi	incontri programmati di sensibilizzazione formazione degli operatori sull'utilizzo degli strumenti standardizzati di valutazione	
		10.000,00
Spese generali	spese sostenute dall'Ente per realizzare il progetto	
		5.000,00





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

UNITA' OPERATIVA ASL BA		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale	n.1 psicologo a 18 ore	
		30.000,00
Beni e servizi	materiale cartaceo computer e cellulare	
		5.000,00
Missioni	spostamenti verso altre sedi per attività formative, di informazione e collegamento	
		7.500,00
Incontri/Eventi formativi	incontri programmati di sensibilizzazione	
		5.000,00
Spese generali	spese sostenute dall'Ente per realizzare il progetto	
		5.000,00





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA - SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

UNITA' OPERATIVA ASL LE		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale	n.1 psicologo a 18 ore	
		30.000,00
Beni e servizi	materiale cartaceo computer e cellulare	
		5.000,00
Missioni	spostamenti verso altre sedi per attività formative, di informazione e collegamento	
		7.500,00
Incontri/Eventi formativi	incontri programmati di sensibilizzazione	
		5.000,00
Spese generali	spese sostenute dall'Ente per realizzare il progetto	
		5.000,00

PIANO FINANZIARIO GENERALE	
Personale	125.000,00
Beni e servizi	35.605,00
Missioni	25.000,00
Incontri/Eventi Formativi	20.000,00
Spese generali	15.000,00
Totale	220.605,00

